
КРАТКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА (BPRS)

Инструкция для Врачей:

Краткая Психиатрическая Оценочная Шкала (The Brief Psychiatric Rating Scale, BPRS) широко используется для оценки позитивной, негативной и аффективной симптоматики у лиц, имеющих психотические расстройства, особенно для диагностики состояния у лиц с диагнозом шизофрении. Она оказалась особенно ценным инструментом для подтверждения эффективности лечения у пациентов с тяжестью состояния от умеренной до тяжелой степени.

Шкала должен использовать врач, который хорошо знаком с психотическими расстройствами и умеет интерпретировать конструкции, используемые в этой шкале для оценки. Оценивается как непосредственно наблюдаемое врачом состояние пациента, так и его поведение в течение 2-3 дней, предшествовавших контакту с врачом, информацию об этом следует получить у людей, которые окружали пациента в этот период (семья, родственники, сослуживцы, и т.д.).

Шкала BPRS состоит из 18 конструкций, относящихся к различным симптомам психических расстройств; само интервью с выставлением оценок занимает, как правило, не более 30 минут. Врач, оценивающий выраженность того или иного симптома, должен проставить ее оценку по семибалльной шкале, где 1 – отсутствие симптома, а 7 – его крайняя тяжесть. 0 (ноль) выставляется, если симптом не оценивался.

Впервые опубликовано в 1962 году в виде инструмента, состоящего из 16 конструкций докторами Джоном Овероллом и Дональдом Горхемом (Drs. John Overall and Donald Gorham). Позже разработчики добавили два дополнительных пункта, в результате чего шкала в теперешнем ее виде содержит 18 элементов и широко используется для оценки эффективности лечения.

Интерпретация результата:

Сложите оценки по всем 18 пунктам. Запишите общий балл. Спустя несколько дней терапии сделайте то же самое. Сравните значения общего балла в динамике с целью определения качества ответа на терапию